

TERNAKAN KAMBING

Dalam klasifikasi ternakan,

kambing disenaraikan sebagai:-

🐾 Kelas (class)	- Mamalia
🐾 Pecahan Kelas (sub class)	- Eutheria
🐾 Order (order)	- Artiodacyla (berjari sama rata)
🐾 Pecahan Order (sub order)	- Pecoca (ruminan)
🐾 Keluarga (family)	- Bovidae
🐾 Pecahan keluarga (sub-family) Genus	- Caprinae (kambing)
🐾 Jenus (genus)	- Capra (kambing)
🐾 Spesies (species)	- <u>Capra hirus</u> (Capra aegagrus)
	- <u>Capra ibex</u>
	- <u>Capra pyrenaica</u>
	- <u>Capra caucasia</u>
	- <u>Capra falconeri</u>

CARA KLASIFIKASI KAMBING:

- 🔊 Tempat spt Asia, Afrika, dan lain-lain
- 🔊 Rupabentuk anggota spt telinga panjang, pendek, tegak atau berjuntai
- 🔊 Kegunaan samada utk daging, susu, bulu, kulit dan lain-lain
- 🔊 Besar badan dan tinggi spt besar, sederhana, atau kerdil

Satu lagi cara yang digunakan sekarang ialah “Height at withers” (ukuran dari kaki sampai ke tulang bahu (skapula). Cara ini mempunyai kaitan dgn besar badan. Kalau bentuk badan besar begitu juga dgn ukuran tinggi. Dgn cara ini kambing boleh dibahagi kpd 3 kumpulan:-

🐾 Kambing kerdil	- bawah 50 cm (berat 18-25 kg)
🐾 Sederhana	- 51-65 cm (19-27 kg)
🐾 Besar	- atas 65 cm (20-53 kg)

BAKA-BAKA KAMBING DI DUNIA

Populasi kambing di dunia dianggap lebih kurang 400 juta dan 22% darinya terdapat dikawasan temperate sementara 78% di kawasan tropika dan subtropika, iaitu di kawasan kering di mana sukatan hujan kurang dari 45 cm. Taburan yang banyak sekali ialah di Afrika dan India

Baka-baka kambing yang terkenal di dunia

- 🐐 Afrika
 - Nubian, Sahle, Maradi (Red Sokoto), kambing kerdil (Dwarf goat), south Sudan Dwarf, Somali, Boer, Somali Arab dan Small East African Goat
- 🐐 Timur Tengah dan Timur Dekat – Angora, Damanscus dan Syrian Mountain }
 - Goat (Mamber)
- 🐐 India Dan Pakistan
 - Jamnapari, Beetal, Barbari, Black Bengal, Malabar, Bari, Osmanabad dan Kamori
- 🐐 Tenggara Asia
 - Kambing Katjang
- 🐐 Cina dan Tibet
 - Ma'Tou, South China Dwarf Goat, Cahsmere Goat
- 🐐 Amerika Selatan
 - Maxoto dan Marota
- 🐐 Eropah
 - Saanen, Toggenburg, British Alpine dan lain-lain

KAMBING KACANG (KATJANG)

- 🐐 Berasal dari Malaysia dan indonesia
- 🐐 Kegunaan untuk daging
- 🐐 Warna bulu biasanya hitam , coklat kadang-kadang terdapat tompok putih dikaki dan badan
- 🐐 Telinga tegak disisi
- 🐐 Purata ketinggian
 - 50- 60 cm
- 🐐 Berat lahir
 - 1 - 2 kg
- 🐐 Berat dewasa
 - 20 - 25 kg

JAMNAPARI / ETTAWAH

- 🐾 Berasal dari India
- 🐾 kegunaan untuk daging & susu
- 🐾 Muka cembong (Roman nosed)
- 🐾 Warna bulu campuran hitam dan kekuningan
- 🐾 Telinga panjang dan melampai ke bawah dan berlipat
- 🐾 Purata ketinggian 91 - 127 cm
- 🐾 Berat lahir 3 - 4 kg
- 🐾 Berat dewasa ♂ 68-91 kg, ♀ 36 -63 kg.

ANGLO NUBIAN

- 🐾 Berasal dari England -campuran baka Zariiby (Mesir dan Jamnapari)
- 🐾 kegunaan untuk daging & susu (2 kg/hari)
- 🐾 Muka cembong (Roman nosed)
- 🐾 Warna bulu coklat kemerahan, putih , coklat gelap atau kombinasi warna
- 🐾 Telinga panjang dan melampai ke bawah dan merapati kepala, biasa tidak bertanduk
- 🐾 Purata ketinggian 80 cm
- 🐾 Berat lahir 3 - 3.5 kg
- 🐾 Berat dewasa ♂ 70-85 kg. ♀ 55 - 70 kg.

PEMILIHAN BAKA


JANTAN	BETINA
Warna berbeza mengikut baka	Warna berbeza mengikut baka
Kulit dan bulu lembut , pendek dan berkilat tiada kulit berlipat bawah dagu dan tengkuk Lembut , pendek licin dan berkilat tiada kusut	Lembut , pendek licin dan berkilat tiada kusut

JANTAN	BETINA
--------	--------

SAIZ	SAIZ
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Besar dan berat badan lebih 25 kg (Had minima berbeza mengikut baka & umur) 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Sedang atau tidak kurang 20 kg (Had minima berbeza mengikut baka & umur)
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Kepala Sederhana , bertanduk atau tidak bertanduk mata bersinar 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Panjang dan sederhana .
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Leher dan bahu tidak panjang dan pejal 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Leher jinjang , bahu kecil dan sempit
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Dada Bidang dan gempal 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Sederhana
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Rangka bulat dan sama besar 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Badan bulat
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Badan gempal , panjang dan besar 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Badan tegap
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Bahagian belakang lurus, tegap, lebar dan berdaging penuh 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Lurus, tegap, lebar
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Kaki belakang tegap dan kukuh kedua-dua selari peha lebar dan besar 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Tegap dan kukuh kedua-dua selari
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Kaki hadapan tegap dan kukuh kedua-dua selari 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Kaki hadapan tegap dan kukuh kedua-dua selari
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Tapak kaki rata, boleh berdiri tetap dan melangkah dengan baik . kuku pendek 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Tapak kaki tetap dan melangkah dengan baik. kuku pendek
<p>♂ Buah zakar dan zakar Zakar baik boleh dikeluarkan dan masuk dengan baik, buah zakar ada dua dan tergantung dengan baik serta tegang tidak terlampau kendur</p>	<p>♀ Ambing susu dan puting susu Tergantung dengan baik. Kulit lembut dan licin , Puting sederhana menghala ke hadapan dan terletak dengan baik</p>
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Tabiat cergas serta, gagah 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Cergas Serta subur
<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Kesihatan sihat dan tidak mempunyai penyakit yang berjangkit 	<ul style="list-style-type: none"> 🐐 Sihat dan tidak mempunyai penyakit yang berjangkit. Subur

PERANGKAAAN KAMBING TAHUN (2000)

Populasi kambing 237,113



Pengeluaran tempatan (Mutton) - 983 . M. Tan

Penggunaan 14,000 M. Ton

Penggunaan Perkapita 0.6 kg

Kadar saradiri 18 %

LAHIR HINGGA CERAI SUSU

Dalam masa 6 jam diberi kolostrum

Ibu mengeluarkan kolostrum selama 3 hari

Tali pusat dicelup iodine

Anak menyusui ibu antara 3-4 bulan

Ibu dan anak didalam kandang dan dilepaskan
pada minggu ke 4 – 6

CERAI SUSU HINGGA DEWASA

Anak dipisahkan dari ibu

Anak dipisahkan mengikut jantina

Anak disimpan dalam petak berlainan dan meragut bersingan

PENGURUSAN IBU BUNTING DAN SELEPAS BERANAK

Pemakanan yang sempurna

Ibu bunting dan ibu yang melahirkan anak dipisahkan mengelak anak kecil dari
dipijak

PENGURUSAN KAMBING JANTAN

Semua jantan diasingkan

Nisbah jantan dan betina 1:20

Pemakanan yang cukup

Mula mengawan ketika berumur 9 bulan